



serval

FICHE CONSEILS

Prévention Virus
Parasite Bactérie
Diarrhées Réhydratation
Sevrage

VEAUX D'ÉLEVAGE

Les diarrhées du veau



LES DIARRHÉES DU VEAU

LES FACTEURS DÉCLENCHANTS

Il existe 4 types de diarrhées chez le veau :

-  bactérienne
-  virale
-  parasitaire
-  alimentaire






1/4 des veaux sont atteints au cours du premier mois de vie. L'identification rapide du type de diarrhée est donc déterminante pour éliminer la cause et mettre en œuvre une réhydratation efficace.

QU'EST CE QU'UNE DIARRHÉE ?

C'est l'émission de matières fécales abondantes dont la consistance, la couleur et l'odeur sont anormales. Elle résulte d'une perturbation plus ou moins sévère de l'absorption des aliments ingérés au travers de la muqueuse intestinale. Elle entraîne une perte brutale en eau et en éléments minéraux (sodium, potassium, magnésium) avec un affaiblissement rapide de l'animal.



DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE DIARRHÉES

ÂGE DES GÉNÉSSES	ASPECT DE LA DIARRHÉE	SYMPTÔMES ASSOCIÉS	ORIGINES	ILLUSTRATIONS
Dès le premier jour	Diarrhée très liquide, jaune paille	Déshydratation rapide Mortalité parfois élevée	Colibacilles	Diarrhée bactérienne colibacillaire 
Dès le premier jour	Diarrhée glaireuse de couleur marron, verte ou orange. Si cryptosporidies, diarrhée plutôt jaune et pâteuse parfois avec des filets de sang	Déshydratation Perte d'appétit Attitude prostrée Forte odeur des fécès peu ou pas de T°	Rotavirus coronavirus	Diarrhée à cryptosporidies 
A partir de 5 jours			Cryptosporidies (souvent associées à l'un des virus ci-dessus)	
Plus de 11 jours	Diarrhée blanchâtre, très liquide avec grumeaux et odeur acide	Possibilité d'alternance d'épisode de diarrhée liquide et pâteuse	Mauvaise digestion du lait souvent due à des erreurs de conduite alimentaire	Diarrhée blanche pâteuse 
	Diarrhée + ou - collantes à odeur de beurre rance ou de pourriture	Difficulté à rester debout Démarche chancelante Ventre enflé et douloureux Peu de déshydratation	Mauvaise digestion du lait Colibacilles	
	Diarrhée très liquide accompagnée de sang et de fausses membranes	Fièvre Mortalité très élevée	Salmonelles Colibacilles	Diarrhée à coccidies 
Plus de 18 jours	Diarrhée sanguinolente ou noirâtre	Efforts d'expulsion	Coccidies	Diarrhée virale glaireuse 
	Diarrhée glaireuse ou mucoïde	Larmolement et bave Fièvre parfois Perte d'appétit Ulcérations buccales Attitude prostrée	Virus BVD / MD (souvent associé à d'autres agents)	

LES FACTEURS DE RISQUE D'APPARITION DES DIARRHÉES

La conduite générale du troupeau :

- Hygiène et propreté des locaux et du matériel
- Mélange d'animaux de tous âges
- Absence de vaccination des mères (diarrhées récurrentes)
- Attention aux animaux adultes porteurs sains (virus et parasites)

Les mères :

- Carences alimentaires en cours de gestation
- Colostrum ou lait de qualité insuffisante

Le logement des veaux :

- Ambiance d'élevage défavorable : aération, humidité, température insuffisantes ou excessives, surpopulation
- Manque d'hygiène : pas de local d'isolement des malades, vide sanitaire mal réalisé, paillage insuffisant...

Les veaux :

- Prise de colostrum insuffisante
- Fragilités particulières : carences variées, stress

CONCLUSION

L'identification du type de diarrhée, la réactivité du vétérinaire (selon l'origine de la diarrhée) et la réhydratation rapide du veau permettront de sauver l'animal et de préserver son potentiel de développement. La connaissance et la maîtrise des facteurs de risques d'apparition des diarrhées permettent de faire une prévention efficace. Serval met son expérience à votre service pour vous aider à passer ce cap délicat pour le veau.

Avant toute chose, il est nécessaire de demander l'avis d'un vétérinaire.



**DECouvrez ET DEMANDEZ
NOS AUTRES FICHES CONSEILS**