



serval

FICHE CONSEILS

Colostrum
Ambiance Horaires
Buvée
Bâtiment Lait
Croissance
Eclairage Sevrage
Elevage
Ventilation Seau

VEAUX D'ÉLEVAGE

Réussir leur sevrage



LE SEVRAGE



LES OBJECTIFS



OBTENIR DES
GÉNISSES DE 200 KG
À 6 MOIS OU 30% DE
LEUR POIDS
ADULTE



ATTEINDRE UNE
CROISSANCE
JOURNALIÈRE
DE 900G



FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DES PAPILLES
RUMINALES :
7.5 MM



MORTALITÉ
INFÉRIEURE
À 10%




SEVRAGE VERS
10 SEMAINES



CONSEILS D'ÉLEVAGE



- S'il existe un local de vêlage, le désinfecter le jour du vêlage et le jour suivant.
- Faire consommer **RAPIDEMENT** le colostrum entre la 1ère et la 2ème heure après vêlage (environ 2 litres).
- Contrôler la qualité du colostrum par un réfractomètre notamment pour les cas de report par congélation.
- Isoler le veau durant les 8 premiers jours avant le passage en nurserie.
- Nettoyer et désinfecter les seaux après chaque distribution de lait.



SOIGNER LA DISTRIBUTION DU COLOSTRUM

- 1.5 à 2 litres dans les deux premières heures
- Puis 2 à 2.5 litres en 2 fois/jour à 40°C.



SOIGNER LA DISTRIBUTION DU LAIT

- Suivre les plans d'allaitement.
- 45 kg de poudre de lait : correspond à 400-450 litres de lait entier.

A SURVEILLER :

- La température de buvée 40°C
- La concentration de la buvée de 12 à 15% de poudre de lait soit 120 à 150 g/L
- Le volume d'une buvée 3.5 à 4 litres (= volume de la caillette)
- La régularité des horaires de buvée

PRENDRE EN COMPTE : LE COMPORTEMENT DES VEAUX

- Si manque d'appétit : prendre la température (39.5°C)
- Si ballonnement : vérifier la présence d'eau ainsi que sa température (trop d'écart entre la température du lait et celle de l'eau = refus de boire)
- L'hiver : mettre à disposition de l'eau tiède dans des seaux dès l'âge de 3 semaines



ÉVITER LES ERREURS



- ☒ Prise de colostrum tardive après le vélage ou insuffisante
- ☒ Température de dilution du lait non respectée
- ☒ Température de buvée trop basse
- ☒ Volume de buvée trop important
- ☒ Mauvaise concentration de la buvée : gamme de poudre/litre de buvée
- ☒ Distribution de lait entier pas assez chaud ou trop riche en matière grasse
- ☒ Horaires irréguliers de buvée
- ☒ Mélange de colostrum avec lait reconstitué
- ☒ Local froid et humide
- ☒ Litière insuffisante et humide
- ☒ Ventilation inexistante ou avec des courants d'air
- ☒ Eclairage insuffisant
- ☒ Désinfection superficielle du local et des seaux



**DECOUVREZ ET DEMANDEZ
NOS AUTRES FICHES CONSEILS**